

FACTEURS DE RISQUE DE SURDIT 

INFECTION CONG NITALE

- CMV
- Toxoplasmose
- Rub ole
- Syphilis

D FICIENCE AUDITIVE G N TIQUE

- Ant c dents familiaux de surdit  h r ditaire (ex : parents, grands-parents, fr re/s eur ou cousins)
- Consanguinit  du 1er ou 2e degr  (ex : les parents ou grands-parents sont cousins germains)
- Malformations et syndromes associ s   une d ficiency auditive
- Malformations isol es du pavillon auriculaire

INTOXICATION MATERNELLE DURANT LA GROSSESSE

- Pr sence de syndrome d'alcoolisme f tal

CONDITIONS N ONATALES SP CIFIQUES

- Poids de naissance <1500g
- Apgar de 0   6   5 minutes
- Hyperbilirubin mie pr coce (avant 2 jours) n cessitant un traitement OU hyperbilirubin mie n cessitant une phototh rapie intensive (Bilicrystal ou autre) ou une exsanguino-transfusion (cfr. courbes de r f rence)

SOINS M DICAUX

- Traitement par oxyg nation par membrane extra-corporelle (ECMO)
- S jours en soins intensifs n onataux de plus de 5 jours
- Ventilation assist e pendant 24 heures ou plus
- Administration de m dication ototoxique d'une dur e sup rieure   2 jours (ex : aminoglycosides ou diur tiques de l'anse, ...)

MALADIES SP CIFIQUES

- M ningite ou n cessit  d'une consultation neurologique (ex : convulsion, hypotonie, troubles de la d glutition/alimentaire, et paralysie du nerf cr nien)
- Hypothyro die cong nitale
- L sions au niveau de la substance blanche ou h morragies intra-ventriculaires