

RISICOFACTOREN GEHOORVERLIES

CONGENITALE INFECTIE

- CMV
- Toxoplasmose
- Rodehond
- Syfilis

ERFELIJK GEHOORVERLIES

- Familiale voorgeschiedenis van erfelijk gehoorverlies (bijv: ouders, grootouders, broer/zus of neef/nicht)
- 1ste of 2de-graads bloedverwantschap (bijv: de ouders of grootouders zijn volle neven of nichten)
- Misvormingen en syndromen geassocieerd met gehoorverlies
- Geïsoleerde misvormingen van de oorschelp

VERGIFTIGING DOOR DE MOEDER TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

- Aanwezigheid van foetaal alcoholyndroom

SPECIFIEKE NEONATALE SITUATIES

- Geboortegewicht <1500g
- Apgar-score 0 na 6 tot 5 minuten
- Neonatale hyperbilirubinemie (vóór 2 dagen) die een behandeling vereist OF hyperbilirubinemie die intensieve fotherapie (Bilicrystal of andere) of een exsanguino-transfusie (zie referentiecures) vereist

MEDISCHE ZORG

- Extracorporele membraanoxygenatie (ECMO)
- Verblijf in neonatale intensieve zorgen gedurende meer dan 5 dagen
- Kunstmatige beademing gedurende 24 uur of meer
- Toedienen van ototoxische medicatie voor gedurende meer dan 2 dagen (bijv: aminoglycosiden of lisdiuretica ...)

SPECIFIEKE ZIEKTEN

- Meningitis of nood aan een neurologische consultatie (bijv: stuip trekkingen, hypotonie, slik- of voedingsproblemen en hersenzenuwverlamming)
- Congenitale hypothyroidie
- Witte stof laesies of intraventriculaire bloedingen